

YaraVita™ LEOTRAC
rostlinný biostimulant

Žadatel: YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1,110 00

Výrobce: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Velká Británie

Číslo rozhodnutí o registraci: 5432

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	hodnota v %	hodnota v g/l
Humínové látky	15,0	180
Celkový uhlík jako C	10,0	120
Celkový mangan jako Mn	1,0	12
Celkový zinek jako Zn	1,0	12

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Rostlinný biostimulant YaraVita™ LEOTRAC obsahuje mangan, zinek a humínové látky získané z minerálu leonardit, je určený k půdní nebo listové aplikaci.

Rozsah a použití:

YaraVita™ LEOTRAC je plně formulovaná pomocná látka pro aplikaci na list a do půdy na bázi humínových látek z minerálu leonardit. YaraVita LEOTRAC byl vyvinut pro zmírnění negativních dopadů abiotického stresu, pro zefektivnění příjmu živin z půdy a jejich využití. YaraVita LEOTRAC přispívá ke zlepšení půdní struktury a zvyšuje efektivitu rhizosféry. Zinek a mangan jsou významnými komponenty antioxidantních enzymů a hrají důležitou roli v produkci a aktivaci rostlinných hormonů. Díky nízkému pH YaraVita LEOTRAC je velmi dobře mísitelný a lze ho aplikovat společně s dalšími produkty YaraVita a s většinou POR.

Mísitelnost ověřte na www.tankmix.com.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Listová aplikace:

Obiloviny: 1-2 l/ha od fáze odnožování (Zadok 12) do objevení 2. kolénka (Zadok 27-32). V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Kukuřice: 1-2 l/ha ve stádiu 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Brambory: 1-2 l/ha při velikosti rostlin 30 cm a při výskytu stresových faktorů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 300 l

Řepka: 1-2 l/ha ve fázi 4-9 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Cukrová řepa: 1-2 l/ha ve fázi 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Mák: 1-2 l/ha ve fázi 4-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Ostatní polní plodiny: 1-2 l/ha. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Listová zelenina: 1-2 l/ha ve fázi 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Kořenová zelenina: 1-2 l/ha ve fázi 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: min. 200 l/ha

Brukvovitě: 1-2 l/ha ve fázi 4-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Ovocné stromy: 1-2 l/ha v 10-14 denních intervalech před kvetením, v průběhu kvetení a ve fázi počátečního růstu plodů. Dávka vody: min. 200 l/ha

Drobné ovoce, jahody, réva vinná: 1-2 l/ha v kritických fázích růstu, jako jsou vegetativní růst, před kvetením, po odkvětu, při nasazování plodů v 10-14 denních intervalech, 4 až 5 aplikací za sezonu. Dávka vody: min. 200-500 l/ha

Půdní aplikace:

Zelenina: 2-5 l/ha před výsadbou/vysetím

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ.

Před otevřením kanystru vždy obsah pečlivě protřepte!

Při zapnutí míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutí míchání.

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt (y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Bezpečnostní list na adrese <https://www.yaraagri.cz/vyziva-rostlin/bezpecnost/bezpecnostni-listy/>

Piktogramy nebezpečnosti

:



Signální slovo

: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

: H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence

: P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P261 Zamezte vdechování plynu nebo par.

Reakce

: P391 Uniklý produkt seberte.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830

VŠOBEČNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY najdete na adrese:

<https://www.yaraagri.cz/siteassets/dokumenty/vop-yara.pdf/>

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40°C).

S použitými obaly nakládejte dle příslušných předpisů. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Informace pro přepravu: ADR 9, UN č. 3082.

Výrobek se dodává balený. Objem balení:

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže:

Více na www.yaraagri.cz