

Zlepšený účinek hnojiv YaraVita díky formulačním přísadám

- Smáčecí prostředky vedou k optimálnímu pokrytí povrchu listů. Kontaktní plocha kapky hnojiva s listem se zvětšuje a živiny mohou být lépe absorbovány.
- Adhezivní prostředky zajišťují odolnost proti smyvu a dlouhodobější výživu rostliny přes list. Produkty se nesmývají ani při dešti.
- Absorpční prostředky se postarají o bezpečnou absorpci a rozvod živin v rostlině.
- Disperzní látky zabraňují shlukování částic živin v suspenzích. Takto je zaručena dlouhá stabilita produktu v obalu i při vysoké koncentraci živin. Zabrání se ucpávání trysek v postřikovači a je zajištěna vynikající mísitelnost* s prostředky na ochranu rostlin.



Hnojiva YARA pro výživu zeleniny

YaraMila™ COMPLEX

12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

Unika™ CALCIUM

14,2% N+24% K₂O+12% CaO
Vysoce kvalitní a dobře rozmetatelné granulované NK hnojivo s vápníkem

YaraLiva™ NITRABOR

Prilovaný ledek vápenatý 15,5%N s obsahem boru pro lepší příjem vápníku

YaraLiva™ CALCINIT

100% vodorozpustný ledek vápenatý do všech závlahových systémů a všech druhů postřiků

YaraVita™ BRASSITREL PRO

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro optimální listovou výživu mikroprvky

YaraVita™ MANTRAC PRO

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro odstranění nedostatku manganu listovou aplikací

KRISTALON™ ŽLUTÝ 13+40+13+MIKROPRVKY

KRISTALON™ ORANŽOVÝ 6+12+36+MIKROPRVKY

KRISTALON™ SPECIÁL 18+18+18+MIKROPRVKY

Všechny informace uvedené v letáku mají charakter doporučení, jejich využitím nevznikají žádné právní nároky vůči společnosti YARA.

* Pokyny k možnostem míchání hnojiv YaraVita s prostředky na ochranu rostlin naleznete na: www.tankmix.cz



Knowledge grows

Výživa zeleniny

Komplexní program



Komplexní program výživy zeleniny

Knowledge grows

	Před setím nebo výsadbou	Půdní aplikace		Fertigace				Listová aplikace	
	YaraMila™ COMPLEX	Unika CALCIUM	YaraLiva™ NITRABOR	KRISTALON ŽLUTÝ 3 kg/ha	KRISTALON SPECIÁL 3 kg /ha	KRISTALON ORANŽOVÝ 3 kg/ha	YaraLiva™ CALCINIT 5 kg/ha	YaraVita™ BRASSITREL PRO 3-4 l/ha	YaraVita™ MANTRAC PRO 1 l / ha
Květák	600 kg/ha	250 kg/ha 2-3 týdny po výsadbě	150-200 kg/ha 4-5 týdnů po vý- sadbě	2 týdny po výsadbě	3-4 týdny po výsadbě	na počátku růstu růžic 2x / 10 dni	v okamžiku tvorby růžice	od 4-6 pravého listu až do období hlavní vegetativní fáze	
Zelí	600 kg/ha	150 kg/ha 3 týdny po výsadbě	2x 150 kg/ha 5-7 týdnů po vý- sadbě	2 týdny po výsadbě	3-4 týdny po výsadbě	20 % velikosti hlávky, 3x / 5-7 dní střídavě s CALCINITEM	počátek tvorby hlávek až do 20 % velikosti 3x / 5-7 dní	od 4-6 pravého listu až do období hlavní vegetativní fáze	týden po vytvoření hlávek
Pekingské zelí	500-700 kg/ha		2x 150-200 kg/ha 3-5 týdnů po výsadbě	2 týdny po výsadbě	3-4 týdny po výsadbě		od 4 týdne 5-6x /týden		
Mrkev	550-800 kg/ha	150-250 kg/ha ve fázi 4-6 pravých listů		2-3 pravé listy za- čátek tvorby kořene	ve fázi 4-6 pravých listů 2x / 2 týdny	ve fázi 10 listů 2x / 10-14 dní		ve fázi 3-8 listů	
Petržel	500-650 kg/ha	150-250 kg/ha ve fázi 4-6 pravých listů			začátek tvorby kořene 2x / 2 týdny	ve fázi 10 listů 2x / 10-14 dní			
Celer	550-850 kg/ha	100-150 kg/ha 3 týdny po výsadbě	100-150 kg/ha 4-5 týdnů po výsadbě		během intenzivního růstu	začátek tvorby kořene			
Okurka polní	500-700 kg/ha	100-150 kg/ha na začátku tvorby plodů	150 kg/ha ve fázi 2 pravých listů		během intenzivního růstu	3x / 2 týdny na začátku tvorby plodů střídavě s CALCINITEM	3x / 2 týdny ve fázi tvorby plodů		ve fázi 6 pravých listů

POZN.: Specifické dávky se můžou lišit podle regionů, klimatických a půdních podmínek a musí být podle toho upraveny. Vždy čtěte etiketu před použitím.